



DOBOL[®]

GEL 2%

USO DOMÉSTICO

- Única combinación de atrayentes alimenticios naturales.
- Novedoso gel cucarachicida a base de Acetamiprid.
- Alto consumo del cebo sin aversión.

Alta eficacia con efecto Residual Potenciativo

Concepto Toxicológico No: ERIAP-CT-2020-0632

Registro INVIMA: 2022V-0000066

Presentaciones: Jeringas: 10 g y 35 g.




Alta eficacia con efecto Residual Potenciativo

- **Dobol® Gel 2%** es una nueva formulación en gel para el control de cucarachas y pescaditos de plata que contiene como ingrediente activo el Acetamiprid 2% (20 g/kg), un insecticida de la familia de los neonicotinoides.
- **Dobol® Gel 2%** viene listo para usar como herramienta vital en el control de todo tipo de cucarachas.
- **Dobol® Gel 2%** es de acción rápida y confiable, los resultados se hacen visibles en pocos días.
- **Dobol® Gel 2%** contiene una matriz proteica y atrayente que garantiza la no aversión al cebo como en el caso de los geles con azúcares.
- **Dobol® Gel 2%** está diseñado para el control amateur y profesional de cucarachas.
- **Dobol® Gel 2%** Actúa principalmente por ingestión y también por contacto.
- **Dobol® Gel 2%** es una fórmula de gran estabilidad: No se seca y mantiene sus propiedades químicas por muchas semanas.
- **Dobol® Gel 2%, controla eficazmente:** Cucaracha Alemana, Cucaracha Americana, Cucaracha Oriental y Lepismas.

Modo de acción del Acetamiprid

- El ingrediente activo del **Dobol® Gel 2%** es un compuesto químico de la familia de los neonicotinoides derivado de un extracto natural de la planta conocida como *Nicotiana tabacum* de fórmula química $C_{10}H_{11}ClN_4$. Molécula original desarrollada por la empresa japonesa Nippon Soda.
- Actúa principalmente por ingestión pero también por contacto.
- El Acetamiprid afecta el Sistema nervioso, causando hiperactividad, espasmos musculares y la muerte del insecto.
- El Acetamiprid es altamente tóxico para los insectos, pero menos tóxico a mamíferos y aves, esto es debido al cambio en la morfología de los receptores nicotínicos en los vertebrados.



Molécula de Acetamiprid

Aplicación y dosis de uso

- Edificios residenciales, escuelas, instalaciones comerciales e industriales (incluidos almacenes, supermercados, restaurantes, hoteles, instalaciones de almacenamiento y manipulación de alimentos).
- Aplicar de nuevo una vez el cebo haya sido consumido.
- Limpie la superficie tratada únicamente para detener el efecto biocida. Limpie luego con un detergente y agua caliente.
- **Dobol® Gel 2%** Brinda una protección de hasta 12 semanas.




Formulado por:



KWIZDA AGRO GMBH con domicilio en AUSTRIA filial de KWIZDA France SAS, de Francia.

GOTAS

- **Dosis:** Aplique puntos de cebo (0,1 g, tamaño de una lenteja).
- **Tratamiento preventivo de cocina:** 2 a 3 gotas por m^2 ; en baños: 1 a 2 gotas; otras habitaciones: 1 a 2 gotas por 10 a 15 m^2 .
- **Tratamiento curativo:** Duplicar las dosis recomendadas para el tratamiento preventivo.



Cómo funciona Dobol® Gel 2%



APLICACIÓN: Aplique en los sitios oscuros y húmedos donde se agrupan las cucarachas como en grietas y hendiduras, y en sitios inaccesibles al hombre y animales.



APETENCIA: Contiene proteínas de alta palatabilidad y atractabilidad. Los aditivos alimenticios estimulan el proceso de alimentación de las cucarachas, sin causarles aversión al cebo.



ACCIÓN RETARDADA: El efecto letal toma varias horas en completarse.



REACCIÓN EN CADENA: El insecto consume el gel pero no muere inmediatamente con el fin de poder contaminar a sus congéneres por coprofagia y luego por consumo de cadáveres.



CONTROL COMPLETO: La acción retardada del gel conlleva a contaminar a toda la población.

Importador y Distribuidor exclusivo para Colombia:



VECTORS AND PEST MANAGEMENT LTDA.
Calle 98 No. 22-64 Ofic. 610 - Edificio Calle 100 • Conmutador: 601 483 2472 -
www.vectorsandpest.com • e-mail: info@vectorsandpest.com - Bogotá, D.C. - Colombia